

حقنة Ganirelix Acetate Injection

الدليل الإرشادي الموجز ◀ التجهيز ▶ التحضير ▶ الحقن

قبل البدء



يتم توفير حقنة *Ganirelix Acetate Injection* في محقن مسبق التعبئة ومعقم. ويجب أن يتم حقنها تحت الجلد فقط يُرجى قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام حقنة *Ganirelix Acetate Injection*.

✓ ستحتاجين إلى:

• حقنة *Ganirelix Acetate Injection*

- وسادات التعقيم الكحولية
- وعاء أمان للتخلص من المعدات المستعملة



✓ اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون.



معلومات مهمة حول حقنة

Ganirelix Acetate Injection

داومي على استخدام حقنة *Ganirelix Acetate Injection* حسب ما هو موصوف لك.

لا تحقني باستخدام حقنة *Ganirelix Acetate Injection* حتى تتلقى التعليمات المتعلقة بطريقة استعمال حقنة *Ganirelix Acetate Injection* من مقدم الرعاية الصحية. من الأهمية بمكان أن يوفر لك مقدم الرعاية الصحية رعاية لصيقة.

لا تترجعي حقنة *Ganirelix Acetate Injection* بأية أدوية أخرى في نفس المحقن.

تم التصديق على استخدام حقنة *Ganirelix Acetate Injection* لتثبيط التدرجات المبكرة للهرمون المرتبط بالجسم الأصفر (luteinizing hormone, LH) لدى السيدات اللاتي يخضعن لتحفيز المبايض المضبوط.

معلومات مهمة حول السلامة

لا تستخدم حقنة *Ganirelix Acetate Injection* إذا كنت تعانين من الحساسية من *ganirelix acetate*، أو أي من المكونات الداخلة في التركيبة الدوائية، أو الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (gonadotropin releasing hormone, GnRH) أو أي من النظائر الأخرى لهرمون GnRH (بما في ذلك محفزات هرمون GnRH ومثبطاته) أو في حالة الحمل أو الاعتقاد باحتمال حدوث الحمل.

ينبغي استخدام حقنة *Ganirelix Acetate Injection* فقط حسب الطريقة التي وصفها الأطباء المتخصصون ذوو الخبرة في مجال علاج العقم. ينبغي استبعاد احتمال الحمل قبل البدء في العلاج باستخدام *Ganirelix*.

لوحظ حدوث تفاعلات فرط حساسية (تفاعلات مثيرة للحساسية)، بعضها شديد، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج بحقنة *Ganirelix Acetate Injection*. بادري بالاتصال بأخصائي الرعاية الصحية فور ظهور أي من الأعراض الجانبية التالية: البثور أو صعوبة التنفس أو ضيق الصدر، أو ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، أو القيء أو الإسهال. تحتوي عبوة هذا المنتج على مطاط اللاتكس الطبيعي الذي يمكن أن يسبب بعض التفاعلات المثيرة للحساسية.

قد تسبب حقنة *Ganirelix Acetate Injection* الإصابة بمتلازمة فرط تحفيز المبايض (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS)، والتي تعد حالة مرضية خطيرة يمكن الإصابة بها في حالة الإفراط في تحفيز المبايض. وفي حالات شديدة الندرة، سببت الوفاة. تتسبب متلازمة فرط تحفيز المبايض (OHSS) في تراكم السوائل بشكل فجائي في منطقة المعدة والصدر. بادري بالاتصال بأخصائي الرعاية الصحية فور ظهور أي من الأعراض الجانبية التالية: ألم شديد في منطقة

الحوض (المنطقة الواقعة أسفل المعدة) أو غثيان أو قيء أو زيادة مفاجئة في الوزن أو انخفاض كمية البول.

تشتمل الآثار الجانبية الأخرى لحقنة *Ganirelix Acetate Injection* على ألم في البطن، موت الجنين، والصداع، والذيفان المهبطي، وتأثر موضع الحقن والغثيان. بادري بالاتصال بأخصائي الرعاية الصحية في حالة ظهور أي من الآثار الجانبية المثيرة للقلق.

لا تتردي في إبلاغ إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (Food and Drug Administration, FDA) بالآثار الجانبية السلبية للأدوية الموصوفة. بادري بزيارة الموقع الإلكتروني www.fda.gov/medwatch أو الاتصال بالرقم 1-800-FDA-1088.

يُرجى الاطلاع على معلومات المنتج المهمة المرفقة.

للمزيد من المعلومات، بادري بالاتصال بالرقم 1-800-631-1253 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ganirelix.com.

للحصول على خدمات الدعم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.fertilityjourney.com.


حقنة Ganirelix Acetate Injection الخاصة بك

استخدام

تكمّل نشرة التعليمات هذه تعليمات مقدم الرعاية الصحية حول طريقة تعاطي حقنة Ganirelix Acetate Injection، ولكنها لا تحل محلها. لا ينبغي استخدام الحقنة إلا بعد تلقي التعليمات من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

التجهيز ◀ حدي وأعي موضع الحقن

أكثر المواضع ملائمة للحقن هي منطقة البطن حول السرة أو أعلى الفخذين. استخدمى وسادة التعقيم الكحولية في تنظيف مساحة بوصتين حول النقطة المحددة للحقن حيث سيتم الوخز بالإبرة. اتركى موضع الحقن ليحفظ حوالي دقيقة على الأقل. قومي بتغيير موضع الحقن قليلاً عند كل مرة يتم الحقن فيها.



التجهيز ◀ إزالة غطاء المحقن

وجهي المحقن لأعلى ثم أزيلى غطاء الإبرة. لا تلمسى الإبرة مطلقاً ولا تضعى الإبرة المفتوحة فوق أي سطح على الإطلاق.



الحقن ◀ الحقن باستخدام حقنة Ganirelix Acetate Injection

أمسكى منطقة كبيرة من الجلد بين إصبعيك الإبهام والسبابة. اغرزى الإبرة بمركز الجلد بزاوية ٤٥ إلى ٩٠ درجة من سطح الجلد.

اسحبى المكبس برفق.

إذا دخلت الإبرة في موضعها تحت الجلد بشكل صحيح، فسيكون من الصعب سحب مكبس المحقن.



إذا ظهر دم في المحقن بعد سحب المكبس برفق، فهذا يعني أن طرف الإبرة قد اخترق أحد الأوردة أو الشرايين. في حالة حدوث ذلك، اسحبى الإبرة قليلاً ثم أعيدى توجيه الإبرة دون إخراج الإبرة من الجلد. أو بدلاً من ذلك، أخرجى الإبرة واضغطي على موضع الحقن باستخدام وسادة التعقيم الكحولية. سيتوقف النزيف خلال دقيقتين. تخلصى من إبرة المحقن الأصلية على الفور. قومي بإعادة خطوة الحقن باستخدام محقن مسبق التعبئة معقم آخر.

بمجرد إدخال الإبرة بشكل صحيح، اضغطي على المكبس ببطء وثبات حتى يتم تفريغ المحقن.

أخرجى الإبرة بسرعة ثم اضغطي على موضع الحقن باستخدام وسادة التعقيم الكحولية.

واصلى الضغط على موضع الحقن مع تدليكك برفق لتوزيع حقنة Ganirelix Acetate Injection والتخفيف من أي شعور غير مريح بالألم.

تخلصى من الإبرة والمحقن وفقاً لتعليمات مقدم الرعاية الصحية. لا تستخدمى المحقن مرة أخرى.



لقد أتممت عملية الحقن بنجاح!

Schering-Plough