

Ganirelix Acetate para inyección



Guía *instructiva* rápida

► **PREPARE** ► **AJUSTE** ► **INYECTE**



Información importante sobre Ganirelix Acetate para inyección

Siempre utilice Ganirelix Acetate para inyección como se le recetó. No inyecte Ganirelix Acetate para inyección hasta que haya recibido las instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a la administración de Ganirelix Acetate para inyección. Los cuidados exhaustivos brindados por su proveedor de atención médica son muy importantes.

No mezcle Ganirelix Acetate para inyección con ningún otro medicamento en la misma jeringa.

Ganirelix Acetate para inyección está aprobado para la inhibición de los picos prematuros de la hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés) en mujeres que se someten a hiperestimulación ovárica controlada.

Información de seguridad importante

No utilice Ganirelix Acetate para inyección si es alérgica al acetato de ganirelix o a alguno de sus componentes, la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o cualquier otro GnRH análogo (que incluye a los agonistas y antagonistas de GnRH) o si está embarazada o cree que puede estarlo.

Ganirelix Acetate para inyección sólo debe ser recetado por médicos con experiencia en el tratamiento de la infertilidad. Antes de comenzar el tratamiento con Ganirelix, se debe descartar un embarazo.

Se han informado algunas reacciones de hipersensibilidad (alérgicas), algunas graves, después de la primera dosis de Ganirelix Acetate para inyección. Llame inmediatamente a su profesional de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas: urticaria, dificultad para respirar, opresión en el pecho, presión arterial alta o baja, vómitos o diarrea. El envase de este producto contiene látex de goma natural, que puede causar reacciones alérgicas.

Ganirelix Acetate para inyección puede provocar el síndrome de hiperestimulación ovárica (OHSS, por sus siglas en inglés), que es un problema médico grave que puede presentarse cuando los ovarios son sobreestimulados. En casos aislados ha ocasionado la muerte.

Antes de comenzar



Ganirelix Acetate para inyección se suministra en una jeringa precargada estéril y es sólo para administración subcutánea (debajo de la piel). Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar Ganirelix Acetate para inyección.

- ✓ Necesitará:
 - Ganirelix Acetate para inyección;
 - gasas con alcohol;
 - un recipiente de seguridad especial para desechar los suministros usados.
- ✓ Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón.



El síndrome de hiperestimulación ovárica provoca la acumulación repentina de líquido en el área del estómago y del tórax. Llame inmediatamente a su profesional de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas: dolor intenso en la pelvis (área baja del estómago), náuseas, vómitos y aumento de peso repentino o reducción en la eliminación de orina.

Otros efectos secundarios de Ganirelix Acetate para inyección incluyen dolor abdominal, muerte del feto, dolor de cabeza, sangrado vaginal, reacción en el lugar de la inyección y náuseas. Si presenta algún efecto secundario que le preocupe, llame a su profesional de atención médica.

Le instamos a que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información importante del producto que se adjunta.


Para obtener más información, llame al 1-800-631-1253 ó visite www.ganirelix.com.

Para obtener servicios de apoyo, visite www.fertilityjourney.com.

Cómo utilizar su **Ganirelix Acetate** para inyección

Esta hoja de instrucciones complementa, pero no reemplaza las instrucciones de su proveedor de atención de médica con respecto a la administración de Ganirelix Acetate para inyección. Debe utilizarse sólo después de haber recibido las instrucciones de su proveedor de atención médica.

PREPARE ▶ Elija y prepare el lugar de inyección.



Los lugares más convenientes para la inyección son en el abdomen alrededor del ombligo o la parte superior del muslo. Con una gasa con alcohol, limpie un área de dos pulgadas alrededor del punto donde se insertará la aguja. Deje que se seque por un minuto.

Varié el lugar de la inyección un poco con cada inyección.

AJUSTE ▶ Destape la jeringa.



Con la jeringa hacia arriba, quite el protector de la aguja.

Nunca toque la aguja ni coloque una aguja abierta sobre alguna superficie.

INYECTE ▶ Inyecte el Ganirelix Acetate para inyección.



Pellizque un área grande de la piel con los dedos índice y pulgar.

Inserte la aguja en la base de la piel pellizcada en un ángulo de 45 a 90° de la superficie de la piel.

Tire del émbolo hacia atrás suavemente.

Si la aguja no se inserta correctamente, será difícil tirar del émbolo hacia atrás.

Si ve sangre en la jeringa después de tirar suavemente del émbolo hacia atrás, quiere decir que la punta de la aguja ha penetrado en una vena o arteria. Si esto sucede, retire la aguja levemente y colóquela nuevamente sin sacarla de la piel. Otra alternativa es sacar la jeringa y aplicar presión en el lugar con una gasa con alcohol. El sangrado debiera detenerse en un par de minutos. Deseche inmediatamente la aguja y la jeringa original. Utilice una nueva jeringa estéril precargada y repita el paso de la inyección.



Una vez que la aguja se inserte de forma correcta, presione el émbolo lenta y constantemente hasta que la jeringa esté vacía.



Saque la jeringa rápidamente y aplique presión en el lugar de la inyección con una gasa con alcohol. Mantenga la presión y masajee suavemente el lugar para dispersar Ganirelix Acetate para inyección y así ayudar a aliviar cualquier malestar.

Deseche la aguja y la jeringa de acuerdo a las instrucciones de su proveedor de atención médica. **NO LAS USE NUEVAMENTE.**

¡Ha completado su inyección!